

Institutul National de Sanatate Publica
Centrul National de Supraveghere
si Control al Bolilor Transmisibile

Institutul de Pneumoftiziologie
“Marius Nasta”

Scrisoare metodologica privind vaccinarea BCG, citirea cicatricii vaccinale BCG si recuperarea restantierilor

Actualizare 04.08.2016

- 1. Vaccinarea BCG** se face la nou-nascut in maternitate, la varsta de 2-7 zile si este asigurata gratuit, in cadrul Programului National de Vaccinare (PNV).
Copilul HIV pozitiv nu se vaccineaza BCG, iar cel nascut din mama HIV pozitiva va fi testat HIV dupa 2 luni de la nastere si va putea fi vaccinat BCG doar in cazul unui rezultat negativ.
- 2. Citirea cicatricii vaccinale BCG nu se mai recomanda**, avand in vedere ca unele tipuri de vaccin BCG nu lasa cicatrice, desi asigura protectie fata de formele severe de boala (miliara tb, meningita/meningo-encefalita tb).
- 3. Recuperarea** la vaccinarea BCG se face astfel:
 - in timp cat mai scurt, **FARA testare la tuberculina**, a copiilor nevaccinati la nastere, cu **varsta sub 3 luni**;
 - in timp cat mai scurt, **CU testare la tuberculina**, a copiilor nevaccinati la nastere, cu **varsta de minimum 3 luni** si rezultat negativ la aceasta testare (0-9 mm pentru copiii fara infectie HIV), dar nu mai tarziu de **4 ani**.

4. Directia de Sanatate Publica Judeteana / a Mun.Bucuresti decide locul recuperarii la vaccinarea BCG:

- in **ambulatoriul spitalului** cu care DSP are contract pentru aceasta vaccinare, intr-un cabinet dedicat sau cu separarea circuitelor functionale in timp

sau

- in **dispensarul de pneumoftiziologie** pendinte de spitalul cu care DSP are contract pentru aceasta vaccinare, intr-un cabinet dedicat sau cu separarea circuitelor functionale in timp.

In cazul in care, la chestionarea parintilor/apartinatorilor privind existenta unui caz de tuberculoza in familie, raspunsul este pozitiv, copilul va fi indrumat mai intai, pentru evaluare, la dispensarul de pneumoftiziologie.