MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL de SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

CNSCBT


Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE
Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro

Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2018-2019

Saptamana 18.03.2019 – 24.03.2019 (S 12/2019)

- Activitatea gripala a avut un trend descrescator, a evoluat cu intensitate medie, cu extindere regionala in zona de centru a tarii si cu focare locale si cazuri sporadice in celelate zone ale tarii.
- Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai scazuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta. Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 83275, cu 14.4% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (97277) si cu 9.1% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (91618).
- S-au inregistrat la nivel national 721 cazuri de gripa clinica, cu urmatoarea distributie geoagrafica:



- Au fost inregistrate **21** de cazuri de **Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 8 mai putine fata de saptamana anterioara si cu 17 mai putine fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.

- De la inceputul sezonului 2018-2019 au fost inregistrate **186 decese confirmate cu virus gripal**, din care **143 tip A, subtip (H1)pdm09**, **20 tip A, subtip H3**, **22 tip A, nesubtipat** si **1 coinfectie cu A(H1)pdm09 si AH3**, fata de **129** in intreg sezonul precedent, din care 63 cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, 2 cu AH3, 4 cu A nesubtipat si 60 cu virus gripal tip B.

Obiective: reducerea numarului de cazuri severe si de decese cu gripa

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa subtip AH1+AH3	Total cazuri gripa	Total decese confirmare cu virus gripal
Alba	36	14	0	0		50	1
Arad	33	3	0	0		36	9
Arges	111	28	1	0		140	5
Bacau	17	8	0	0		25	2
Bihor	18	11	0	0		29	2
Bistrita	1	1	0	0		2	1
Botosani	1	1	0	0		2	0
Brasov	13	6	0	0		19	0
Braila	6	0	1	0		7	3
Buzau	8	3	0	0		11	0
Caras	81	53	0	0		134	9
Calarasi	9	3	0	0		12	3
Cluj	12	7	61	0		80	11
Constanta	20	15	66	1		102	11
Covasna	2	1	0	0		3	1
Dimbovita	24	13	0	0		37	4
Dolj	18	2	1	0		21	1
Galati	13	8	1	0		22	8
Giurgiu	17	0	3	0		20	8
Gorj	8	0	0	0		8	1
Harghita	0	0	0	0		0	0
Hunedoara	21	10	0	0		31	4
Ialomita	2	0	0	0		2	3
Iasi	27	80	16	0		123	4
Maramures	11	0	0	0		11	0
Mehedinti	11	0	0	0		11	1
Mures	18	11	0	0		29	5
Neamt	2	3	0	0		5	0
Olt	120	57	0	0		177	8
Prahova	168	18	2	0	2	190	33
Satu Mare	13	4	0	0		17	0
Salaj	10	3	0	0		13	3
Sibiu	12	2	0	0		14	4
Suceava	2	3	0	0		5	2
Teleorman	22	8	0	0		30	3
Timis	23	4	0	0	1	1	10
Tulcea	3	5	0	0		8	0
Vaslui	1	3	0	0		4	1
Vilcea	8	1	0	0		9	0
Vrancea	6	3	0	0		9	2
Bucuresti	244	105	331	0	1	1	21
Ilfov	5	1	1	0		7	2
Total	**1177**	**498**	**484**	**1**	**4**	**2164**	**186**

- De la inceputul sezonului au fost confirmate **2164** cazuri de gripa, din care:

  - 1177 cazuri gripa cu virus AH1
  - 498 cazuri gripa cu virus AH3
  - 484 cazuri gripa cu virus A nesubtipat
  - 1 caz gripa cu virus B
  - 4 cazuri gripa cu coinfectie cu virus AH1 + virus AH3

Pana la data de **24.03.2019** au fost vaccinate antigripal **1.329.039** persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

Recomandari:

1. **Pentru populatie:**

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

2. **Pentru spitale:**

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

Intocmit, redactat:
Dr. Lavinia Zota, Dr. Odette Popovici