



Evolutia bolii meningococice pe teritoriul Romaniei, 2015

In anul 2015, pe teritoriul Romaniei, au fost raportate 61 de cazuri suspecte de boala meningococica, dupa cum urmeaza: CRSP Timis: niciun caz, CRSP Cluj: 11 cazuri (18%), CRSP Iasi: 15 cazuri (24,6%) si CRSP Bucuresti: 35 cazuri (57,4%), din care s-au confirmat 51. Cele mai multe cazuri suspecte au fost raportate si confirmate in luna martie, asa cum se observa in graficul de mai jos.



Din cele 42 de judete, 24 au raportat cazuri suspecte de boala meningococica. Nu au fost raportate cazuri suspecte de boala meningococica in judetele: Alba, Arad, Arges, Botosani, Buzau, Caras Severin, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Mures, Salaj, Teleorman, Timis, Tulcea si Valcea.




Din totalul de 61 cazuri suspecte s-au confirmat 51 (83,6%), din care: 49 confirmate cu laboratorul, doar doua ramanand probabile. Cazurile probabile au fost cazuri in stare foarte grava, cu septicemie si sdr. Waterhouse-Friederichsen. Ele au fost clasificate astfel deoarece, chiar daca rezultatul de laborator pentru meningococ a lipsit (probele biologice neputand fi prelevate din cauza starii grave a pacientilor), acestia au prezent semne clinice caracteristice bolii meningococice. Boala meningococica a evoluat sub forma de cazuri sporadice. Cele mai multe cazuri confirmate s-au inregistrat in municipiul Bucuresti: 10 (19,6%).

Distributia cazurilor de boala meningococica pe judete, Romania 2015




S-au infirmat 10 cazuri suspecte de boala meningococica (cate 2 din judetele Bistrita Nasaud Brasov si Satu Mare, cate 1 din judetele Bihar, Iasi si Neamt), cu diagnosticile: “meningita bacteriana de etiologie neprecizata” (4 cazuri), “purpura de etiologie neprecizata” (2 cazuri), si cate 1 caz cu “purpura fulminans, stare toxico-septica”, “purpura, sdr. Waterhouse-Friederichsen”, “reactie meningeala, sdr. febril” si “meningita cu *Streptococcus pneumoniae*”.



Caracteristici epidemiologice in evolutia cazurilor confirmate de boala meningococica, teritoriul Romaniei, 2015

84% din cazurile de boala meningococica au fost reprezentate de cazuri de meningita meningococica.




La 27 dintre cazurile confirmate (52,9%) s-a determinat serotipul de meningococ: serotip A – 3 cazuri, serotip B – 18 cazuri si serotip C – 6 cazuri.


Distributia pe judete a serotipurilor de meningococ este prezentata in tabelul de mai jos:

	BH	BV	BB	CL	CT	HR	IL	IS	IF	MH	NT	PH	SB	SV	VN	VS	Total
Serotip A	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Serotip B	1	-	4	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	1	2	1	18
Serotip C	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
TOTAL	1	4	6	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	27


Distributia pe sexe a cazurilor de boala meningococica este: sexul feminin – 22 cazuri (43%), sexul masculin – 29 cazuri (57%).



Distributia cazurilor de boala meningococica pe grupe de varsta, a evidentiat predominanta cazurilor la grupa de varsta de 1-4 ani: 11 cazuri (21,7%), urmata de grupele de varsta 5-9 ani: 7 cazuri (13,7%), sub 1 an: 6 cazuri (11,8%), peste 65 ani: 5 cazuri (9,7%), 50-54 ani si 55-59 ani: cate 4 cazuri (7,8%), 20-24 ani si 25-29 ani: cate 3 cazuri (5,9%), 10-14 ani, 15-19 ani si 45-49 ani: cate 2 cazuri (3,9%) si 30-34 ani si 40-44 ani: cate un caz (2%).




Distributia cazurilor pe medii de rezidenta a evidentiat o distributie a cazurilor in favoarea mediului urban: mediul urban - 27 de cazuri (53%) si mediul rural – 24 cazuri (47%).



Forma de boala a fost: severa in 45,1% din cazuri, medie in 51% si usoara in 3,9%.

S-a inregistrat un numar de 8 decese prin boala meningococica, la cazuri severe, depistate tardiv si care au decedat in primele ore de la internarea in serviciul de asistenta medicala.

Rata mortalitatii specifice prin boala meningococica pe teritoriul Romaniei in anul 2015, a fost de 0,063‰ loc. pe teritoriul CRSP Bucuresti si 0,046‰ loc. pe teritoriul CRSP Cluj. CRSP Iasi si CRSP Timis nu au inregistrat decese prin boala meningococica.



Cazurile de deces s-au inregistrat la grupele de varsta sub 1 an, 55-59 ani si peste 65 ani (cate 2 cazuri) si 5-9 ani si 10-14 ani (cate 1 caz).


Rata mortalitatii specifice pe grupe de varsta prin boala meningococica

Grupa de varsta	Rata mortalitatii specifice (%ooo loc.)
sub 1 an	1,102
5-9 ani	0,094
10-14 ani	0,094
55-59 ani	0,141
peste 65 ani	0,060

Rata mortalitatii prin boala meningococica in Romania a fost de 0,040%ooo loc.

Rata de fatalitate prin boala meningococica Romania a fost de 15,69%.

73% din contactii cazurilor de boala meningococica (504 contacti dintr-un total de 687) au primit chimioprofilaxie.



Mulumim, tuturor judetelor care au inteles necesitatea supravegherii bolii meningococice si au colaborat, atat prin acuratetea datelor transmise cat si prin trimiterea de tulpini pentru confirmare /serotipare la INCDMI Cantacuzino.