



Evolutia bolii meningococice pe teritoriul Romaniei, 2013

In anul 2013, pe teritoriul Romaniei, au fost raportate 68 de cazuri suspecte de boala meningococica, dupa cum urmeaza: CRSP Timis: 1 caz (1,5%), CRSP Cluj: 11 cazuri (16,2%), CRSP Bucuresti: 16 cazuri (23,5%) si CRSP Iasi: 40 cazuri (58,8%), din care s-au confirmat 53. Cele mai multe cazuri suspecte au fost raportate si confirmate in luna aprilie, asa cum se observa in graficul de mai jos.



Din cele 42 de judete, 23 au raportat cazuri suspecte de boala meningococica. Nu au fost raportate cazuri suspecte de boala meningococica in judetele: Alba, Arad, Bistrita Nasaud, Buzau, Caras Severin, Constanta, Covasna, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman si Tulcea.




Din totalul de 68 cazuri suspecte s-au confirmat 53 (78%), din care: 52 confirmate cu laboratorul, doar unul ramanand probabil. Cazul probabil a fost caz in stare foarte grava, cu septicemie si sdr. Waterhouse-Friederichsen. El a fost clasificat astfel deoarece, chiar daca rezultatul de laborator pentru meningococ a lipsit (probele biologice neputand fi prelevate din cauza starii grave a pacientului), a prezent semne clinice caracteristice bolii meningococice.


Boala meningococica a evoluat sub forma de cazuri sporadice.

Cele mai multe cazuri confirmate s-au inregistrat in judetul Vrancea: 15 (28,3%).

Distributia cazurilor de boala meningococica pe judete, Romania 2013




S-au infirmat 15 cazuri suspecte de boala meningococica (cate 2 din judetele Botosani, Brasov, Cluj si Galati, cate 1 din judetele Arges, Bacau, Dambovita, Neamt, Vaslui, Valcea si Timis), cu diagnostichele: “meningita bacteriana de etiologie neprecizata” (6 cazuri), “purpura/petesii, hemoragica sau nu, de etiologie neprecizata” (3 cazuri), “sepsis” cu diferite determinari (2 cazuri), si cate 1 caz cu “meningita bacteriana cu *Moraxella catarrhalis*”, “meningita TBC”, “meningoencefalita bacteriana de etiologie neprecizata” si “meningita cu *Streptococcus pneumoniae*”.



Caracteristici epidemiologice in evolutia cazurilor confirmate de boala meningococica, teritoriul Romaniei, 2013

79% din cazurile de boala meningococica au fost reprezentate de cazuri de meningita/meningoencefalita meningococica.




La 37 dintre cazurile confirmate (69,8%) s-a determinat serotipul de meningococ: serotip A – 1 caz, serotip B – 25 cazuri, serotip C – 9 cazuri, serotip ACYW135 – 1 caz si serotip YW135 – 1 caz.


Distributia pe judete a serotipurilor de meningococ este prezentata in tabelul de mai jos:

	BC	BH	BT	BV	BB	CL	CJ	GL	IS	MS	VS	VN	Total
Serotip A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Serotip B	-	2	3	1	2	1	-	2	6	1	1	6	25
Serotip C	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	9
Serotip ACYW135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Serotip YW135	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
TOTAL	1	2	3	1	2	1	1	3	7	3	1	12	37


Distributia pe sexe a cazurilor de boala meningococica este: sexul feminin – 34 cazuri (45%), sexul masculin – 42 cazuri (55%).



Distributia cazurilor de boala meningococica pe grupe de varsta, a evidentiat predominanta cazurilor la grupa de varsta de 1-4 ani: 13 cazuri (24,5%), urmata de grupele de varsta sub 1 an si 5-9 ani: cate 11 cazuri (20,9%), 10-14 ani: 7 cazuri (13,2%), 15-19 ani: 3 cazuri (5,7%) si 25-29 ani, 35-39 ani, 60-64 ani si peste 65 ani: cate 2 cazuri (3,7%).




Distributia cazurilor pe medii de rezidenta a evidentiat o distributie uniforma a cazurilor: mediul rural – 38 cazuri (50%) si mediul urban - 38 de cazuri (50%).



Forma de boala a fost: severa in 34,9% din cazuri, medie in 62,3% si usoara in 3,8%.

S-a inregistrat un numar de 5 decese prin boala meningococica, la cazuri severe, depistate tardiv si care au decedat in primele ore de la internarea in serviciul de asistenta medicala.

Rata mortalitatii specifice prin boala meningococica pe teritoriul Romaniei in anul 2013, a fost de 0,043‰ loc. pe teritoriul CRSP Cluj si 0.064‰ loc. pe teritoriul CRSP Iasi. CRSP Bucuresti si CRSP Timis nu au inregistrat decese prin boala meningococica.




Cazurile de deces s-au inregistrat la grupele de varsta sub 1 an (3 cazuri) si 10-14 ani si peste 65 ani (cate 1 caz).

Rata mortalitatii specifice pe grupe de varsta prin boala meningococica

Grupa de varsta	Rata mortalitatii specifice (‰000 loc.)
sub 1 an	1,503
10-14 ani	0,091
peste 65 ani	0,031

Rata mortalitatii prin boala meningococica in Romania a fost de 0,023‰000 loc. Rata de fatalitate prin boala meningococica Romania a fost de 9,3%.

78% din contactii cazurilor de boala meningococica (754 contacti dintr-un total de 962) au primit chimioprofilaxie.



Mulumim, tuturor judetelor care au inteles necesitatea supravegherii bolii meningococice si au colaborat, atat prin acuratetea datelor transmise cat si prin trimiterea de tulpini pentru confirmare /serotipare la INCDMI Cantacuzino.