

Anexă 10. Originea Septicemiei (sursa Septicemiei) listă coduri

Asociate cateterului	
C-CVC	Cateter vascular central, cu legătură clinică (ex. simptomatologia se ameliorează în 48 ore de la îndepărtarea dispozitivului)
C-PVC	Cateter vascular periferic, cu legătură clinică (ex. simptomatologia se ameliorează în 48 ore de la îndepărtarea dispozitivului)
*	CRI3-CVC, cateter vascular central, cu confirmare microbiologică
*	CRI3-PVC, cateter vascular periferic, cu confirmare microbiologică
Secundare infecțiilor cu altă localizare	
S-PUL	Infecție pulmonară
S-UTI	Infecție de tract urinar
S-SSI	Infecție de situs chirurgical
S-DIG	Infecție de tract digestiv
S-SST	Infecție a pielii și a țesuturilor moi
S-OTH	Alte infecții (ex. meningită, osteomielită, etc.)
Septicemie cu origine necunoscută	
UO	Niciuna din cele mai sus menționate; Septicemie confirmată cu origine necunoscută

* Notă: Nu raportați CRI3 ca Septicemie cu origine C-CVC sau C-PVC, în schimb folosiți CRI3-CVC sau CRI3-PVC; vezi definițiile CRI.