

Riscuri de sanatate in timpul perioadei de desfasurare a carnavalului din Brazilia

Carnavalul din Brazilia va avea loc in perioada 1- 9 martie 2019 si se estimeaza ca vor participa aproximativ 1 milion de oameni, inclusiv multi calatori din Europa. Sarbatoarea este foarte populara in Brazilia in diferite orase si state cum ar fi Salvador da Bahia, Recife si Manaus. In concordanta cu Asociatia Internationala de Transport Aerian numarul de calatori din EU/EEA catre Rio de Janeiro in 2017 a fost 467 000, cei mai multi fiind din Portugalia, Franta si Marea Britanie.

In timpul evenimentelor de masa cele mai frecvente riscuri pentru sanatatea sunt legate de bolile prevenibile prin vaccinare, afectiunile gastro-intestinale, bolile transmise prin vectori in conditii climatice favorabile.

Inainte de eveniment

Inainte de calatoria in Brazilia, participantii la Carnaval trebuie sa se asigure ca au toate vaccinarile la zi in acord cu programul national de vaccinare din tara lor de origine, in particular trebuie sa aiba doua doze de vaccin impotriva rujeolei (MMR), rubeolei, difteriei, tetanosului si polio. In plus trebuie luata in considerare vaccinarea impotriva hepatitei A, meningococului ACWY, febrei tifoide si febrei galbene.

In acord cu Ministerul de Sanatate din Brazilia, de la inceputul lunii iunie 2018 pana in 18 ianuarie 2019, in tara sunt 12 cazuri confirmate si alte 116 cazuri suspecte de febra galbena. Calatorii catre ariile de risc de febra galbena¹, incluzand statul Rio de Janeiro, trebuie sa consulte furnizorii de servicii medicale din tara lor inainte de calatorie si sa se vaccineze impotriva febrei galbene cu cel putin 10 zile inaintea calatoriei (exceptie cei la care aceasta este contraindicata). De asemenea trebuie sa urmeze masurile de protectie impotriva intepaturilor de tantari si sa fie informati despre simptomele febrei galbene.

In anul 2018, Brazilia a raportat 174 724 de cazuri confirmate de febra denga. Sunt aproximativ 90000 de cazuri de boala determinata de virusul Chikungunya dintre care jumatate sunt raportate in Rio de Janeiro. In plus aproximativ 8 000 de cazuri probabile de boala determinata de virusul Zika au fost raportate in Brazilia, din care peste 2000 de cazuri in Rio de Janeiro. Peste 10 000 de cazuri confirmate de rujeola au fost raportate in 2018 in Brazilia, in principal in statele Amazonas si Roraima, dar si 19 cazuri au fost raportate in Rio de Janeiro.

In timpul evenimentului

Participantii la Carnavalul de la Rio sunt sfatuiti sa respecte regulile de igiena si masurile de prevenire impotriva muscaturilor de tantari. Masurile de prevenire sunt necesare pentru a reduce riscul de expunere la febra galbena, Zika, Denga, Chikungunya si malaria.

Pentru protejarea impotriva sifilisului, gonoreei, HIV, hepatita B si C se recomanda practici sexuale sigure si utilizarea prezervativului. Calatorii trebuie sa consulte furnizorii lor de servicii medicale pentru vaccinarea impotriva hepatitei B.

Dupa eveniment

In caz de imbolnavire la intoarcere, calatorii trebuie sa spuna medicului lor ca au stat in Brazilia. Calatorii care necesita spitalizare in EU dupa ce au fost spitalizati in Brazilia trebuie sa raporteze internarea lor anterioara pentru a nu intarzia posibila constatare a unor infectii recente asociate actului medical.

Ariile de risc de febra galbena Brazilia:

¹ <https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/yellow-fever-distribution-and-areas-risk-brazil>

Sursa: ECDC *“Health risks during the Carnival season in Brazil”*

<https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/health-risks-during-carnival-season-brazil>